


13 czerwca 2025

**Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca choroby
pryszczycy u zwierząt**

MRiRW

The logo of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW) of Poland, featuring the acronym 'MRiRW' in a black, sans-serif font, with a thick red horizontal line underneath.



PRYSZCZYCA

PODSTAWOWE ZASADY BIOASEKURACJI CHROŃ SWOJE GOSPODARSTWO PRZED WIRUSEM PRYSZCZYCY.

PAMIĘTAJ:

- 1** Zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa muszą pochodzić z legalnego źródła i być zidentyfikowane, a zwierzęta spoza Polski muszą mieć świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny (dla świń świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny obowiązuje także w obrocie krajowym).
- 2** Przed włączeniem nowo zakupionych zwierząt do stada należy je odizolować przez okres minimum 14, a optymalnie 21 dni.
- 3** Pasze i ściółka dla zwierząt parzystokopytnych muszą pochodzić z wiadomego źródła. W gospodarstwie należy je zabezpieczyć przed dostępem innych zwierząt.
- 4** Ogranicz do minimum kontakt zwierząt z innymi osobnikami, w tym na pastwiskach (ogrodzenia np. elektryczne).
- 5** Koniecznie dezynfekuj urządzenia i narzędzia mające kontakt ze środowiskiem zwierząt. Nie pożyczaj swojego sprzętu i nie korzystaj z narzędzi i sprzętów spoza gospodarstwa.
- 6** Bezwzględnie przestrzegaj zasad higieny osobistej. Przed i po obsłudze zwierząt, w tym zadawaniu pasz czy ściółki: zmień odzież i obuwie, umyj i zdezynfekuj obuwie oraz ręce środkiem wirusobójczym rekomendowanym przez lekarza weterynarii.
- 7** W wejściach do budynków inwentarskich zastosuj urządzenia dezynfekcyjne, np. maty lub kuwety ze środkiem dezynfekcyjnym (działającym na wirusa pryszczycy) i pamiętaj, aby środek systematycznie uzupełniać.
- 8** Zadbaj o ograniczenie odwiedzin w Twoim gospodarstwie do niezbędnego minimum. Wprowadź rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta parzystokopytne oraz rejestr środków transportu do przewozu zwierząt parzystokopytnych, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
- 9** W przypadku zaobserwowania objawów choroby zakaźnej, a w szczególności: gorączki do 40 – 42°C, ślinotoku, kulawizny ze zmianami na racicach i szparach międzyracicowych lub zmian na wymionach natychmiast kontaktuj się z najbliższym lekarzem weterynarii.



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi



[Ulotka.pdf](#)